



# 嘔吐物処理のHow to!



## 嘔吐物処理に必要な物品

嘔吐が発生したら、下記の物品で嘔吐物処理をします。  
いつでも使えるように事前に準備をしておきましょう。

### スタッフが着用する防護具



シューズカバー


使い捨てエプロン  
(袖付き)

使い捨てマスク

使い捨て手袋  
(インナー)

使い捨て手袋  
(アウター)

### 処理時に使う物品



大きめのビニール袋

2ℓペットボトル

次亜塩素酸  
ナトリウム原液

吸水シート


ぞうきん

ペーパータオル



## 次亜塩素酸ナトリウム溶液の作り方


①



塩素濃度を確認

次亜塩素酸ナトリウム原液の  
塩素濃度を確認

②



希釈時の目印  
をつける

2ℓのペットボトルに  
次亜塩素酸ナトリウム原液を入れる

③



手袋着用を  
忘れずに！

水を入れた後、**フタをしっかりと  
閉めて**溶液をよく混ぜる

次亜塩素酸ナトリウム原液の量：溶液1800mLあたり

原液の塩素濃度	0.02%溶液を作る場合	0.1%溶液を作る場合
6% (一般的な家庭用)	6mL	30mL
12% (一般的な業務用)	3mL	15mL



ペットボトルキャップ  
1杯あたり5mL


### 【次亜塩素酸ナトリウム原液について】

開封後長い期間使わずに保管しておくとも原液の濃度が低下し、消毒の効果も下がります。開封したらボトルに**開封日**を記載し、なるべく早めに使いきりましょう！





# 知っておくべきポイント！



1mの高さから嘔吐した場合、半径2mかつ高さ1.6mまで消毒する必要があります。



**立ち入り禁止**


感染拡大を防ぐため  
同じ部屋に人がいる場合は  
速やかに別室へ誘導してください。



## 嘔吐物処理の手順



換気をする。




※上から見えます。

防護具を着用し、嘔吐物にペーパータオルを被せる。外側から内側の順に嘔吐物が隠れるように乗せていく。




次亜塩素酸ナトリウム溶液を上からかける。




外側から内側に向かって嘔吐物やペーパータオルを回収し、ビニール袋に入れる。




汚染されているビニール袋の中に次亜塩素酸ナトリウム溶液をかけ、袋を閉じる。



清潔区域のビニール袋に汚染したビニール袋を入れ閉じる。




半径2m範囲内にペーパータオルを敷き詰める。



ペーパータオルの上から次亜塩素酸ナトリウム溶液をかけ、10分待つ。



10分経過を待つ間に防護具を全て脱ぎビニール袋に捨て、**手袋は新しい物に交換する。**



10分後、外から内側に向かってペーパータオルを回収。ビニール袋に入れる。



最後にぞうきんで床全体を水拭きする。

**Finish!**

清潔



処理が終わったら  
**しっかり手洗い&  
洋服を着替える**  
のを忘れずに！